



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
COORDENAÇÃO DE ADMISSÃO DISCENTE

Processo Seletivo de Transferência Externa 2020/1
Medicina (Internato)
Edital 151/2019 - PROGRAD - 30/01/2020

-----**INTRUÇÕES**-----

- O início da Prova está previsto para as 9h, e o seu encerramento para 4h após.
- Você só poderá sair da sala de aplicação desta Prova após o término do tempo total de sua aplicação.
- Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos. Não é permitido consulta a apontamentos, livros, dicionários ou aparelhos eletrônicos. Solicite a presença do fiscal apenas em caso de extrema necessidade.
- Esta Prova é objetiva e contém 60 questões de múltipla escolha, com 4 alternativas cada.
- Ao utilizar o Cartão-Resposta, primeiro confira o número de sua inscrição e o seu nome. Depois, assine no retângulo adequado (não faça outras anotações ou marcas).
- Para marcar as respostas no Cartão-Resposta, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
- A resposta final de cada questão deverá ser transportada para o Cartão-Resposta, sem rasuras.
- Não serão consideradas as respostas que não forem transportadas para o Cartão-Resposta.
- Em nenhuma hipótese será distribuída duplicata do Cartão-Resposta, cuja numeração é única, personalizada e gerada automaticamente.
- Ao terminar a Prova, o candidato **terá** de devolver ao fiscal:
 - 1) o Cartão-Resposta;
 - 2) o Caderno de Prova.
- Você não poderá, em hipótese alguma, sair levando o Caderno de Prova. Caso seja verificado que levou consigo o Caderno de Prova ou parte dele, você será imediatamente desclassificado, e seu nome será eliminado do Processo Seletivo.

RESULTADO - 04/02/2020 - Publicação do resultado na internet (www.pucgoias.edu.br/vestibular).

MATRÍCULA - A matrícula poderá ser efetuada nos dias **05 e 06/02/2020**, pelo próprio candidato ou por seu procurador legal, que deverá dirigir-se à Secretaria da Escola do curso.

DOCUMENTOS - O candidato deverá apresentar, na matrícula, além dos documentos relacionados no Edital **151/2019**, cópia do cartão de vacina ou comprovante do estado vacinal, atualizados, cujo período de cobertura não se tenha extinguido, com as seguintes vacinas: antitetânica, febre amarela, tríplice viral e hepatite B.

QUESTÃO 01

Um interno de Medicina se contamina com material biológico ao acompanhar seu preceptor em uma cirurgia geral. O estudante realizava uma sutura, com supervisão, quando uma quantidade de sangue espirrou na direção de seu rosto, contaminando seus olhos. Ele ficou desesperado e sem saber o que fazer.

Considere a situação apresentada sob a ótica da Norma Regulamentadora nº 32, do Ministério do Trabalho e assinale a alternativa correta:

- A () O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) deve conter a identificação dos riscos biológicos mais prováveis, como por exemplo transmissibilidade, patogenicidade e virulência do agente.
- B () O estudante se contaminou por não estar utilizando óculos de proteção, um equipamento de proteção individual (EPI), cujo fornecimento é obrigação do empregador.
- C () A relação dos estabelecimentos de saúde que podem prestar assistência ao trabalhador/estudante que se acidentar deve estar prevista no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA).
- D () A NR 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde; logo, não se aplica a casos que envolvam estudantes.

QUESTÃO 02

Em um paciente com quadro de abdome agudo, o exame radiológico simples abdominal apresenta a imagem de uma camada de ar interposta entre o fígado e o diafragma. O exame físico da região mostra o Sinal de Jobert positivo.

Esse achado indica que condição? Assinale a alternativa correta:

- A () Hemorragia abdominal.
- B () Perfuração de víscera oca.
- C () Abdome agudo inflamatório.
- D () Torção intestinal.

QUESTÃO 03

Paciente de 23 anos, feminina, branca, procura assistência médica, pois há 20 dias vem apresentando febre diária (38,3°C) acompanhada de calafrios, mal-estar geral, inapetência e adinamia. O exame físico realizado pelo plantonista demonstra: temperatura axilar de 38,8°C, petéquias nas regiões plantares e palmares, um nódulo de Osler em indicador direito, hemorragia conjuntival. A paciente possui inúmeras marcas de agulhas em membros superiores (paciente então relata ser usuária de drogas intravenosas).

Considere essa descrição e aponte, dentre as alternativas a seguir, a hipótese diagnóstica do plantonista e os exames a serem solicitados para confirmá-la:

- A () Endocardite infecciosa; ecocardiograma e hemocultura.
- B () Endocardite infecciosa; cintilografia e proteína C reativa.
- C () Embolia pulmonar; proteína C reativa e cintilografia.
- D () Embolia pulmonar; ecocardiograma e hemocultura.

QUESTÃO 04

A gestante portadora de tuberculose pulmonar apresenta-se como um grande desafio aos serviços de saúde, devido à vulnerabilidade da condição gestacional, agravada pela doença.

Assim, entendemos que

- A () o tratamento de tuberculose é importante para a mãe gestante, porém não diminui o risco de transmissão ao feto, ao RN e aos que coabitam na mesma residência.
- B () os medicamentos antituberculose passam em pequenas quantidades pelo leite materno; por isso, a importância do seu uso seguro durante a amamentação.
- C () para a mãe, mesmo portadora de tuberculose e com mastite tuberculosa, não está contraindicada a amamentação.
- D () o esquema básico pode ser administrado nas doses habituais para gestantes e, mesmo considerado o risco de toxicidade neurológica ao feto atribuído à isoniazida, não se interrompe seu uso.

QUESTÃO 05

Durante a visita de alojamento conjunto, o médico examinou um Recém-Nascido (RN) de parto normal a termo, pesando 3.300 g. A mãe relatara preocupação com a cabeça do filho. Ao exame físico da cabeça do RN, foi encontrado no couro cabeludo um abaulamento abrangendo os ossos do alto da cabeça, que à palpação era depressível. O pediatra explicou que esse sinal costuma desaparecer nos primeiros meses de vida. Assim, a mãe ficou mais tranquila.

Assinale a alternativa correta em relação ao sinal encontrado no exame físico do RN:

- A () Hemangioma.
- B () Craniotabes.
- C () Bossa serossanguínea.
- D () Céfalo-hematoma.

QUESTÃO 06

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é o transtorno endocrinológico mais comum das mulheres em idade reprodutiva. Do ponto de vista histológico, os ovários policísticos apresentam aumento de volume, do número de folículos, da espessura estromal cortical e de ninhos de células hilares. Muitas dessas alterações podem ser observadas por ultrassonografia.

Os critérios ecográficos de Rotterdam para o diagnóstico de SOP incluem

- A () volume ovariano $\geq 10 \text{ cm}^3$, uni ou bilateral.
- B () volume ovariano $\geq 5 \text{ cm}^3$, bilateral.
- C () presença de múltiplos cistos ovarianos com diâmetro maior que 2 cm.
- D () estroma ovariano hipoecoico.

QUESTÃO 07

Os acidentes com escorpiões têm grande importância entre os acidentes por animais peçonhentos, seja pela incidência, seja pela gravidade dos casos, principalmente em crianças menores de 7 anos. Leia a notícia a seguir, do dia 28 de novembro de 2019, veiculada no Portal G1 Goiás:

“Um menino de um ano e 10 meses morreu na manhã de quarta-feira (27), no Hospital de Doenças Tropicais (HDT), em Goiânia, após complicações causadas pela picada de um escorpião. Segundo a

unidade de saúde, o bebê teve uma parada cardiorrespiratória. O hospital informou, em nota, que o incidente aconteceu em Panamá, cidade da região Oeste de Goiás, onde a família do bebê mora. Ele foi picado na perna direita.”

Sobre acidentes por animais peçonhentos, assinale a alternativa correta:

- A () No escorpionismo, o tempo entre o acidente e o início de manifestações sistêmicas graves é relativamente mais longo do que nos acidentes ofídicos.
- B () A administração dos antivenenos pode causar reações adversas precoces ou tardias, o que recomenda a realização prévia de testes de sensibilidade cutânea.
- C () A maioria dos casos de picadas por escorpião tem evolução benigna, e casos graves e óbitos são mais frequentes em crianças menores de 10 anos.
- D () Os casos mais graves, que evoluem para óbito, são causados pela espécie de escorpião *Tityus bahiensis* (escorpião-marrom).

QUESTÃO 08

Ascite corresponde ao acúmulo de líquido na cavidade abdominal. Suas causas mais frequentes são hepáticas, cardiocirculatórias, renais, inflamatórias e neoplásicas. Quanto ao volume do líquido acumulado, é classificada em ascite de pequeno, médio e grande volume.

Marque a alternativa que corretamente aponta o método ideal para a pesquisa de pequeno volume de ascite:

- A () Ultrassonografia de abdome.
- B () Percussão por piparote.
- C () Pesquisa dos semicírculos de Skoda.
- D () Punção abdominal.

QUESTÃO 09

Paciente de 45 anos, feminina, branca, hospitalizada devido a correção de fratura de quadril direito (acidente automobilístico). É diabética e hipertensa em uso de glicazida e losartana para controle das patologias. Evoluía até então sem qualquer alteração, quando, durante a

noite, apresentou subitamente, dispneia, taquipneia, dor torácica importante e tosse com leves rajadas de sangue.

Assinale a alternativa que, de acordo com esse quadro clínico, aponta o provável diagnóstico da paciente, bem como o exame a ser solicitado para o confirmar:

- A () Pneumonia; radiografia de tórax.
- B () Síndrome coronariana aguda; eletrocardiograma/enzimas cardíacas.
- C () Embolia pulmonar; angiografia pulmonar por tomografia.
- D () Fratura de costelas; radiografia de arcos costais.

QUESTÃO 10

Consideram-se critérios de alta hospitalar nos casos de dengue

- A () a estabilização hemodinâmica nas 24 horas, com ausência de febre por 24 horas e melhora do quadro clínico.
- B () a ausência de febre por 24 horas, hematócrito normal e plaquetas em elevação e acima de 50 mil/mm³.
- C () a estabilização hemodinâmica durante 48 horas e ausência de febre por 48 horas, melhora visível do quadro clínico, hematócrito normal e estável por 24 horas e plaquetas com elevação e acima de 50 mil/mm³.
- D () a estabilização hemodinâmica durante 72 horas e ausência de febre por 48 horas, melhora visível do quadro clínico, hematócrito normal e estável por 48 horas e plaquetas com elevação e acima de 100 mil/mm³.

QUESTÃO 11

Mãe relata ao pediatra uma preocupação com o seu leite, pois é primípara e não tem experiência. Conversara com a vizinha e sua irmã para tomar opinião. Elas falaram que seu leite é fraco. Entretanto, não confia muito nelas, porque elas não amantaram por muito tempo seus filhos.

Assinale a alternativa que apresenta a resposta correta sobre o leite materno:

- A () O médico explica que a cor do leite varia ao longo de uma mamada e também com a dieta da mãe. O leite do início da mamada, o chamado leite anterior, tem aspecto semelhante ao da água de coco, devido a seu alto teor de água; é muito rico em anticorpos.
- B () O médico explica que a cor do leite varia ao longo de uma mamada e também com a dieta da mãe. O leite do meio da mamada tem uma coloração amarelada transparente, conferida pela caseína.
- C () O médico explica que a cor do leite varia ao longo de uma mamada e também com a dieta da mãe. O leite do final da mamada, o chamado leite posterior, é mais claro, em virtude da menor concentração de energia, porque está no final da mamada.
- D () O médico explica que a cor do leite varia ao longo de uma mamada e também com a dieta da mãe. O leite do final da mamada, o chamado leite posterior, é mais claro, esbranquiçado em virtude da maior concentração de betacaroteno, pigmento lipossolúvel presente em vegetais, proveniente da dieta da mãe.

QUESTÃO 12

O Papiloma Vírus Humano (HPV) é um DNA-vírus de dupla hélice simples que infecta principalmente as células epiteliais escamosas e metaplásicas. Os tipos e subtipos de HPV são classificados em função do grau de homologia genética. Sabe-se que esse agente viral está envolvido na gênese do câncer do colo uterino.

Assinale a alternativa que apresenta a resposta correta sobre a ação desse vírus no corpo humano:

- A () Todos os sorotipos de HPV são considerados de alto risco.
- B () Apenas os sorotipos 7 e 9 são considerados de alto risco e, por isso, foram desenvolvidas vacinas específicas para eles.
- C () Os sorotipos 6 e 11 causam verrugas genitais.
- D () A maioria das mulheres infectadas pelo HPV desenvolverá câncer de colo uterino ao longo da sua vida.

QUESTÃO 13

Paciente de 32 anos, sexo masculino, com história de alterações do perfil lipídico e diabetes, passou a apresentar feridas infectadas nos membros inferiores de difícil cicatrização há vários meses. Na última semana, desenvolveu quadro infeccioso com febre e alterações do nível de consciência.

Deu entrada no pronto-socorro do Hospital de Infectologia com suspeita de meningite bacteriana, confirmada por exames laboratoriais, e veio a óbito.

Assinale a alternativa que apresenta a correta causa básica do óbito:

- A () Meningite bacteriana.
 B () Síndrome infecciosa aguda.
 C () Septicemia em consequência das feridas infectadas.
 D () Diabetes.

QUESTÃO 14

Um paciente do sexo masculino, de 56 anos, apresenta dor em andar superior do abdome há 2 meses, de intensidade 6 em 10, com irradiação para o dorso, acompanhada de sensação de plenitude, inapetência, náuseas e emagrecimento de 4 kg no período. Refere que há uma semana apresenta pele e olhos amarelados.

Ao exame físico, nota-se icterícia 3+/4 em pele e mucosas, abdome plano, flácido, indolor à palpação superficial e profunda, sem visceromegalias, e descompressão brusca não dolorosa. Em hipocôndrio direito, a vesícula é palpável e não dolorosa.

Assinale a alternativa que descreve corretamente o sinal semiológico evidenciado por esse exame:

- A () Sinal de Gersuny.
 B () Sinal de Courvoisier.
 C () Sinal de Cullen.
 D () Sinal de Rovsing.

QUESTÃO 15

Paciente masculino, 10 anos, pardo, portador de *diabetes mellitus* tipo I desde os 8 anos, dá entrada no pronto-socorro trazido pelos pais. Eles relatam que a criança vem apresentando, há

4 dias, visão embaçada, fadiga, poliúria, poli-dipsia, sonolência e parece ter febre. Está fazendo uso de insulina conforme prescrito pelo endocrinologista.

Os exames solicitados pelo plantonista demonstram o exposto no quadro a seguir:

| Dosagens | Resultados | Parâmetros |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Glicemia | 405 mg/dl | Normal: até 99 mg/dl |
| Cetonas urinárias | positivas 4+/4+ | Normal: ausentes |
| Gasometria arterial | pH 7,1 | Normal: 7,35 a 7,45 |
| Bicarbonato sérico | 10 mEq/l | Normal: 22 a 28 mEq/l |
| Potássio | 5,5 mEq/l | Normal: 3,5 a 5,5 mEq/l |
| Hemograma | leucocitose e desvio à esquerda | |

A criança está desidratada, com padrão respiratório profundo e trabalhoso; apresenta-se com furúnculo na região da nádega esquerda, quadro esse não mencionado pelos pais.

Consideradas essas informações, assinale a alternativa que apresenta o possível diagnóstico do paciente e a conduta a ser seguida:

- A () Síndrome hipoosmolar hiperglicêmica; reposição volêmica, insulina subcutânea e correção dos distúrbios ácido-básicos e hidroeletrólíticos.
 B () Cetoacidose diabética; reposição volêmica, insulina subcutânea e correção dos distúrbios ácido-básicos e hidroeletrólíticos.
 C () Síndrome hipoosmolar hiperglicêmica; reposição volêmica, insulina intravenosa e correção dos distúrbios ácido-básicos e hidroeletrólíticos.
 D () Cetoacidose diabética; reposição volêmica, insulina intravenosa e correção dos distúrbios ácido-básicos e hidroeletrólíticos.

QUESTÃO 16

O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, descreve as ações e serviços para a instituição de uma região de saúde.

Marque a alternativa que corretamente aponta as ações e os serviços mínimos necessários para a instituição de uma região de saúde:

- A () Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, saúde bucal, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e vigilância em saúde.
- B () Atenção primária, urgência e emergência, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e vigilância em saúde.
- C () Atenção primária, urgência e emergência, assistência farmacêutica, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e vigilância em saúde.
- D () Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar, e vigilância em saúde.

QUESTÃO 17

Durante a primeira consulta no ambulatório de crescimento e desenvolvimento (CD), a mãe relatou que as mamas do bebê estavam muito grandes. Recém-nascido (RN) com 7 dias de vida, nasceu de parto normal a termo, pesando 3.250 g. Está em aleitamento materno exclusivo em livre demanda.

Ao exame físico, apresenta-se em bom estado geral, afebril, corado e eupneico; tórax normal, com mamas ingurgitadas bilateralmente, apêndice xifoide palpável; ausculta cardíaca normal; fígado papável a 2 centímetros do rebordo costal direito; genitália masculina normal, meato uretral centralizado, testículos tópicos e reflexos presentes e normais.

Assinale a alternativa correta sobre o RN, relacionada à presença de ingurgitamento mamário:

- A () Decorre da passagem transplacentária de hormônios maternos e é normal; a conduta recomendada é a aplicação de corticoide tópico.
- B () Decorre da passagem transplacentária de hormônios maternos e é um sinal de alerta; a conduta recomendada é a investigação laboratorial.
- C () Decorre da passagem transplacentária de hormônios maternos e é sinal de alerta; a

conduta recomendada é a aplicação de corticoide tópico.

- D () Decorre da passagem transplacentária de hormônios maternos e é normal; a conduta recomendada é a expectativa.

QUESTÃO 18

A candidíase vulvovaginal é comum em localidades de clima quente e úmido; acomete principalmente gestantes, diabéticas, imunodeprimidas e obesas. O quadro clínico característico é de corrimento e prurido.

Sobre essa vulvovaginite, marque a alternativa correta:

- A () O corrimento vaginal característico é amarelado, fluido, bolhoso e de odor fétido.
- B () O tratamento indicado é o metronidazol por via oral.
- C () O corrimento vaginal característico é branco e grumoso, semelhante a queijo *cottage*.
- D () O tratamento indicado é a azitromicina por via oral.

QUESTÃO 19

A capacidade de os profissionais responderem de modo articulado à demanda de usuários com queixas de sofrimento/adoecimento, identificando e ofertando para cada situação singular ações e procedimentos, está pautada em um dos princípios do SUS.

Um exemplo de exercício dessa capacidade seria, no encontro com o paciente portador de um sofrimento, o médico aproveitar para apreciar fatores de risco de outras doenças que não as envolvidas no sofrimento concreto daquele paciente e investigar a presença de doenças que ainda não se expressaram.

Outro exemplo é o caso de uma enfermeira, que, ao realizar uma consulta de enfermagem para crianças, procura identificar as condições sociais e afetivas da família para o cuidado e a estimulação dessa criança.

Na atenção básica, essas interações entre o usuário e os profissionais são definidas como um dos princípios do SUS.

Assinale a alternativa que corretamente aponta esse princípio:

- A () Integralidade.
- B () Equidade.
- C () Universalização.
- D () Regionalização.

QUESTÃO 20

Durante a realização de uma traqueostomia, após a abertura da rafe mediana cervical, os músculos afastados lateralmente são

- A () os pré-esternais.
- B () os traqueais.
- C () os cervicais laterais.
- D () os pré-tireoidianos.

QUESTÃO 21

Paciente de 58 anos, branco, masculino, procura ambulatório médico com relato de estar com prurido, olhos e pele amarelados. Apresenta também alguns resultados de exames.

O médico, ao examiná-lo, nota escoriações principalmente no tórax e no abdome, ascite, circulação colateral em abdome, icterícia importante, e os exames mostram que a icterícia é às custas de bilirrubina direta.

Em relação ao paciente ora descrito, considere as informações apresentadas nos itens a seguir:

- I - A bilirrubina direta é hidrossolúvel, e o paciente pode apresentar colúria.
- II - Pelos sinais e sintomas apresentados no caso, o paciente tem quadro de colestase.
- III - A presença de circulação colateral em abdome sugere quadro de hipertensão portal.

Marque a alternativa que indica os itens com afirmações corretas:

- A () I e II.
- B () I, II e III.
- C () I e III.
- D () II e III.

QUESTÃO 22

Todos os contatos de hanseníase devem ser informados de que a vacina BCG não é específica para hanseníase. Porém, a vacina BCG-ID

deve ser aplicada nos contatos examinados sem a presença de sinais e sintomas de hanseníase no momento da investigação. Assim, a aplicação da vacina BCG depende da história vacinal e/ou da presença de cicatriz vacinal.

Marque a alternativa que contém a correta profilaxia nesses casos:

- A () Ausência de cicatriz de BCG: 2 doses; uma cicatriz de BCG: uma dose; 2 cicatrizes de BCG: não prescrever.
- B () Ausência de cicatriz de BCG, uma ou 2 cicatrizes de BCG: não prescrever.
- C () Ausência de cicatriz ou uma cicatriz de BCG: uma dose; 2 cicatrizes de BCG: não prescrever.
- D () Ausência de cicatriz de BCG: 2 doses; uma ou 2 cicatrizes de BCG: uma dose.

QUESTÃO 23

Recém-nascido (RN) de parto normal a termo, pesando 3.250 g, saudável, sem queixas, alimentado com leite materno exclusivo em livre demanda.

No exame físico, aos 25 dias de vida, apresenta-se em bom estado geral, afebril, corado e eupneico; tórax normal; ausculta cardíaca normal; abdome com fígado palpável a 2 centímetros do rebordo costal direito; genitália feminina normal e reflexos presentes.

Assinale a alternativa correta sobre o reflexo superficial cutâneo plantar desse RN:

- A () A resposta em extensão é obtida em todas as crianças até por volta de 36 meses de vida, sem que isso seja indicativo de doença.
- B () A resposta em extensão é obtida em todas as crianças até por volta de 18 meses de vida, sem que isso seja indicativo de doença.
- C () A resposta em flexão é obtida em todas as crianças até por volta de 12 meses de vida, sem que isso seja indicativo de doença.
- D () A resposta em extensão pode ser obtida em crianças até por volta de 12 meses de vida, e sua presença é um indicativo de doença.

QUESTÃO 24

A Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou orientações, com base em evidências científicas, para o uso de métodos contraceptivos reversíveis. Esse conjunto de orientações é conhecido como “critérios clínicos de elegibilidade”.

Marque a alternativa que apresenta uma correta avaliação dos critérios da categoria 2:

- A () O método é muito eficaz.
 B () O método tem uma eficácia intermediária.
 C () O risco ao utilizar o método é inaceitável e, portanto, o seu uso é contraindicado.
 D () As vantagens ao se utilizar o método superam os riscos teóricos ou comprovados.

QUESTÃO 25

Família procura unidade básica de saúde para vacinação contra febre amarela e informa viagem próxima para a Região Amazônica.

O pai, de 35 anos, já com 2 doses dessa vacina, a última há 13 anos. A mãe, não vacinada, amamenta filho de 5 meses, que, como o irmãozinho de 4 anos, nunca foi vacinado.

Consideradas as informações aqui descritas, marque a alternativa que corretamente indica que familiares deverão ser vacinados:

- A () Todos.
 B () Todos, exceto o pai que já foi vacinado.
 C () Pai, mãe e filho de 4 anos.
 D () Filho de 4 anos.

QUESTÃO 26

Um paciente deu entrada no pronto-socorro com história de ferimento por arma de fogo em terço superior de hemitórax direito, e lhe foi indicada a drenagem torácica do lado acometido.

O parâmetro anatômico para a realização de anestesia da pele e das outras estruturas da parede do tórax, a fim de evitar lesões do feixe vaso-nervoso deve ser

- A () o ponto médio entre a costela superior e a inferior.
 B () o ponto médio entre articulações costoverbrais.

- C () a borda inferior da costela superior.
 D () a borda superior da costela inferior.

QUESTÃO 27

Paciente de 82 anos, branco, masculino, portador de hipertensão arterial sistêmica há 40 anos, hospitalizado para tratamento de pneumonia, pois não tolerou o uso de medicação oral, mas está evoluindo bem.

Na visita da noite, o plantonista o encontra sonolento, desorientado. O paciente não mantém foco, não reconhece familiares, nem sabe quem é ou onde está. Filha nega qualquer sintoma semelhante prévio e relata que o pai é uma pessoa com boa memória, calma e centrada. Relata também que ele não estava assim no período matutino.

Leia com atenção as informações apresentadas nos itens a seguir:

- I - Alteração da consciência e da cognição.
 II - *Delirium*.
 III - Demência agravada pela infecção pulmonar.

Assinale a alternativa que contém os itens que identificam corretamente o que sugere o quadro clínico do paciente:

- A () I e II.
 B () I, II e III.
 C () I e III.
 D () II e III.

QUESTÃO 28

O escore de Framingham é uma ferramenta útil e de fácil aplicação no dia a dia. Ele classifica, por meio de pontuação, indivíduos com baixo, intermediário e alto grau de risco cardiovascular, e auxilia na definição de condutas.

De acordo com esse escore, marque a alternativa que apresenta o risco corretamente classificado:

- A () Baixo risco: menos de 10% de chance de um evento cardiovascular ocorrer em 10 anos. O seguimento dos indivíduos com

PA limítrofe poderá ser anual após orientá-los sobre estilo de vida saudável.

- B () Risco intermediário: entre 30% e 40% de chance de um evento cardiovascular em 10 anos. O seguimento dos indivíduos com PA limítrofe poderá ser anual após orientações sobre estilo de vida saudável e, se disponível na UBS ou comunidade e for de desejo da pessoa, encaminhamento para ações coletivas de educação em saúde.
- C () Alto risco: mais de 50% de chance de um evento cardiovascular em 10 anos, ou houver presença de lesão em órgão alvo, tais como IAM, AVC, AIT, hipertrofia ventricular esquerda etc.
- D () Baixo risco: entre 10% e 25% de chance de um evento cardiovascular ocorrer em 10 anos. O seguimento dos indivíduos com PA limítrofe poderá ser anual após orientá-los sobre estilo de vida saudável.

QUESTÃO 29

Recém-nascido (RN) de parto normal, do sexo masculino, pesando 2 kg, com 28 semanas de gestação, necessitou de uso de ventilação mecânica e foi encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neo), onde permaneceu em tratamento por 20 dias.

Em relação aos testes de triagem neonatal para esse RN, assinale a alternativa correta:

- A () O Teste do Pezinho não está indicado em razão da idade gestacional do RN.
- B () O Teste do Pezinho é recomendado, e o período ideal para a coleta da primeira amostra está entre o 7º e o 14º dia de vida do RN.
- C () O Teste do Pezinho está indicado para o RN, mas as punções de calcanhar devem ser evitadas. Portanto, recomenda-se a coleta de sangue venoso periférico.
- D () O Teste da deficiência da biotinidase não está indicado por se tratar de um erro inato do metabolismo.

Rascunho

QUESTÃO 30

Joana tem 48 anos e procurou consulta ginecológica com queixa de ondas de calor e secura vaginal há 6 meses. Ela informou que foi histerectomizada há 2 anos. O médico solicitou alguns exames.

Caso já tenha ocorrido a falência ovariana, assinale a alternativa que corretamente apresenta os resultados esperados dos exames:

- A () FSH elevado e estradiol reduzido.
- B () FSH reduzido e estradiol elevado.
- C () Progesterona e hormônio antimulleriano elevados.
- D () LH reduzido e prolactina elevada.

QUESTÃO 31

Nesses últimos anos, alguns estados vêm sofrendo muito com eventos climáticos em razão de fortes chuvas. As consequências desastrosas dessa situação anormal, provocada por fatores adversos, têm causado sérios danos à comunidade ou à vida de seus integrantes e podem levar o Poder Público a decretar estado de calamidade pública.

O reconhecimento desse estado tem início com a expedição do decreto pelo prefeito municipal, ouvida a Comissão Municipal da Defesa Civil, e deve ser imediatamente remetido à Diretoria Estadual de Defesa Civil, para posterior homologação pelo governador do estado, que pode tomar outras providências, a depender de cada ocorrência.

Caracterizado o estado de calamidade pública, a contratação de serviços e a compra de medicamentos ficam sujeitas a que procedimento administrativo? Assinale a alternativa correta:

- A () Nessas contratações/compras, pode-se utilizar da hipótese legal de dispensa de licitação.
- B () Fica proibido realizar licitações em todas as contratações/compras, em razão do estado de calamidade.
- C () Nessas contratações/compras, pode-se utilizar da hipótese legal de inexigibilidade de licitação.

D () Deve-se utilizar licitação simplificada, na modalidade pregão, para a realização de tais contratações/compras.

QUESTÃO 32

Um adulto de 50 anos e 70 kg sofre queimaduras de espessura total em membros superiores e tórax anterior.

Assinale a alternativa que corretamente indica a porcentagem aproximada de área corporal acometida, de acordo com a Regra dos Nove:

- A () 9%.
- B () 18%.
- C () 27%.
- D () 36%.

QUESTÃO 33

Paciente de 15 anos, masculino, pardo, dá entrada no pronto-socorro com quadro de dor em mãos e pés, associada a edema. A dor começou há 2 dias, leve e tolerável, mas, na data da avaliação, é severa. O paciente encontra-se agitado, choroso, sudoreico e taquicárdico; esclera e frênulo lingual com coloração amarelada.

O hemograma de urgência mostra quadro de anemia com hemoglobina de 11 g/dl (valor normal 13 a 18 g/dl), presença no esfregaço sanguíneo de hemácias com morfologia alterada. O paciente refere ter irmão com o mesmo problema.

Em relação ao caso clínico, o paciente apresenta

- A () talassemia com acentuação por provável sangramento digestivo.
- B () anemia falciforme e crise de vaso-oclusão.
- C () leucemia aguda com leucostase.
- D () hemoglobinúria paroxística noturna com crise hemolítica.

QUESTÃO 34

Hipócrates (460 a 370 a.C.) cunhou o postulado “*Primum non nocere*” que significa: primeiro não cause dano. O Pai da Medicina tinha noção, desde essa época, de que o cuidado pode causar algum tipo de dano. Os profissionais e os gestores de saúde não se deram conta de que

houve uma mudança na forma de prestação de cuidados, com o avanço de conhecimentos científicos.

Marque a alternativa que corretamente define o procedimento de Segurança do Paciente:

- A () Cuidado baseado no conhecimento científico para todos que dele possam se beneficiar, evitando-se seu emprego naqueles que provavelmente não se beneficiarão.
- B () Procedimento de se evitar lesões e danos nos pacientes, decorrentes do cuidado que tem como objetivo ajudá-los.
- C () Cuidado sem desperdício, incluindo aquele associado ao uso de equipamentos, suprimentos, ideias e energia.
- D () Qualidade do cuidado que não varia em decorrência de características pessoais, como gênero, etnia, localização geográfica e condição socioeconômica.

QUESTÃO 35

Mãe queixa que sua filha, criança com um ano de vida e crescimento e desenvolvimento adequados para a idade, apresenta febre moderada, inapetência e choro à micção há um dia. A alimentação é igual à da família, além de leite materno pela manhã e à noite. Após exames, o médico levantou hipótese diagnóstica de infecção do trato urinário.

Assinale a alternativa correta em relação à conduta para confirmar o diagnóstico e o agente etiológico mais provável, nesse caso:

- A () Solicitar Hemograma e EAS; o agente etiológico mais provável é *Proteus*.
- B () Solicitar EAS e urocultura; o agente etiológico mais provável é *E. coli*.
- C () Solicitar Hemograma e EAS; o agente etiológico mais provável é *Klebsiella*.
- D () Solicitar EAS e urocultura; o agente etiológico mais provável é *Enterobacter*.

QUESTÃO 36

Secundigesta de 25 anos, volta a consulta de pré-natal trazendo resultados de exames anteriormente solicitados. Primeiro parto, normal; sem antecedentes patológicos. Ao examinar resultado, observa-se: HBsAg +, HBeAg +.

Considerando-se que a transmissão para o RN é paranatal, assinale a alternativa que indica a correta recomendação do Ministério da Saúde, desde 2015, para diminuir a transmissão vertical desses agentes:

- A () Uso de somente vacina contra hepatite B no RN no pós-parto.
- B () Uso de somente vacina contra hepatite B e imunoglobulina no RN no pós-parto.
- C () Uso de antirretroviral desde a 28^a semana de gestação até 4 semanas após o parto, associado a vacina contra hepatite B e imunoglobulina no RN no pós-parto.
- D () Contra indicar amamentação.

QUESTÃO 37

Uma criança é atendida com febre intensa há 4 dias, com relato de exantema inespecífico, prurido, dor e edema nas articulações. O médico suspeita de *chikungunya*, o que é confirmado com exame específico.

Considerado esse caso, marque a alternativa que apresenta a correta conduta quanto à notificação compulsória:

- A () O médico deverá solicitar a enfermeira para notificar, pois é uma atribuição de exclusividade da Enfermagem.
- B () O médico deverá notificar, pois é uma doença de notificação compulsória nacional.
- C () O médico não deverá notificar, pois não é uma doença de notificação compulsória nacional.
- D () O médico deverá notificar apenas se ocorrer complicação na evolução do caso, o que torna compulsória a notificação.

QUESTÃO 38

Durante o tratamento do grande queimado, qual é a principal variável a ser monitorada nas primeiras 24 horas de internação? Marque a alternativa correta:

- A () Pressão arterial sistêmica.
- B () Frequência respiratória.
- C () Dor.
- D () Diurese.

QUESTÃO 39

Paciente de 30 anos, branco, masculino, previamente hígido, procura assistência médica, pois apresenta lesão em pênis, que surgiu há 21 dias. Ao exame, o pênis apresenta uma lesão ulcerada, não dolorosa, de base limpa, com bordas elevadas, firmes e endurecidas.

A lesão é única e, segundo o paciente, começou como uma pápula. De antecedentes, o paciente refere fazer sexo sem proteção e com várias parceiras.

Com relação a esse quadro clínico, ao agente etiológico e ao tratamento, marque a alternativa correta:

- A () Gonorreia; *Neisseria gonorrhoeae*; tratamento com ceftriaxone.
- B () Sífilis secundária; *Treponema pallidum*; tratamento com penicilina G benzatina.
- C () Sífilis primária; *Treponema pallidum*; tratamento com penicilina G benzatina.
- D () Gonorreia; *Neisseria gonorrhoeae*; tratamento com penicilina G procaína.

QUESTÃO 40

O Programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria GM/MS nº 2.979, de 12 de novembro de 2019.

Assinale a alternativa que apresenta o que esse programa estabelece:

- A () Um novo modelo de diretrizes relacionadas à melhoria do esquema de vacinação de crianças, adolescentes, adultos e idosos no âmbito do SUS.
- B () Um novo modelo de estratégias de promoção e prevenção de agravos e doenças relacionadas ao trabalho no âmbito do SUS.
- C () Um novo modelo de ações de vigilância em saúde no âmbito do SUS.
- D () Um novo modelo de financiamento de custeio da Atenção Primária à Saúde no âmbito do SUS.

QUESTÃO 41

Criança de 5 anos de idade chega ao ambulatório de pediatria acompanhada por sua mãe e mais 2 irmãos. Queixa feridas no corpo há 10 dias. Nega febre. Mãe refere que o menino é

muito levado e, por isso, tem algumas escoriações na pele.

Ao exame físico, apresenta lesões do tipo vesículas e bolhas na pele, sem eritema ao redor. As lesões localizam-se no tronco, na face, nas mãos, em áreas intertriginosas, no tornozelo e nas nádegas. Algumas lesões são semelhantes à queimadura de cigarro. Outras lesões apresentam conteúdo seroso, e algumas com crosta amarelada.

Assinale a alternativa que identifica corretamente tais lesões:

- A () Miliária.
- B () Impetigo.
- C () Dermatite de fralda.
- D () Pediculose.

QUESTÃO 42

Paciente de 38 anos de idade, tercigesta com 32 semanas de gestação, chega ao PS queixando dor de cabeça na região da nuca. Faz pré-natal regularmente e apresenta uso de metildopa, 750 mg ao dia, desde a 17ª semana de gestação.

Ao exame: PA 150/100 mmHg, afu 29 cm, du ausente, bcf 144 bpm; toque: colo fechado. Foram solicitados exames, e a paciente foi internada. Os resultados dos exames apontaram: hemograma normal, enzimas hepáticas normais, bilirrubinas normais, ureia e creatinina normal e proteinúria de 24 horas, 570 mg por urina de 24 horas.

Marque a alternativa que corretamente aponta o diagnóstico, considerados os resultados dos exames:

- A () Doença hipertensiva específica da gestação (DHEG).
- B () Hipertensão arterial crônica.
- C () Hipertensão arterial transitória.
- D () Hipertensão arterial crônica com DHEG superajuntada.

QUESTÃO 43

As mudanças nos perfis epidemiológicos e demográficos influenciam diretamente nas ações em saúde voltadas para determinadas populações. No Brasil, as transições demográfica e

epidemiológica começaram na década de 1940 com

- A () a redução da taxa de natalidade.
- B () o aumento das doenças infecciosas.
- C () a queda da taxa de mortalidade.
- D () o aumento das notificações compulsórias.

QUESTÃO 44

Quando o ácido láctico é produzido em resposta a uma lesão, o corpo minimiza a alteração do pH.

Assinale a alternativa que corretamente descreve o modo como ocorre esse processo:

- A () Diminuição da produção de bicarbonato de sódio nos tecidos.
- B () Expiração de dióxido de carbono pelos pulmões.
- C () Excreção de ácido láctico pelos rins.
- D () Diminuição da excreção renal de íons cloro.

QUESTÃO 45

Paciente de 24 anos, feminina, negra, procura ambulatório médico, pois vem apresentado há 2 meses edema progressivo, atualmente generalizado e urina espumosa. Tem como antecedentes ser usuária de heroína e fazer sexo com homens e mulheres sem proteção.

Baseado somente nessas informações, marque a alternativa que corretamente apresenta os possíveis diagnósticos sindrômico e etiológico para essa paciente:

- A () Síndrome nefrótica; glomerulonefrite membranosa.
- B () Síndrome nefrítica; glomerulonefrite membranoproliferativa.
- C () Síndrome nefrótica; glomeruloesclerose segmentar e focal.
- D () Síndrome nefrítica; doença de lesões mínimas.

Rascunho

QUESTÃO 46

De acordo com o Programa de Apoio à Informatização e Qualificação dos Dados da Atenção Primária à Saúde, Informatiza APS, instituído pela Portaria GM/MS nº 2.983, de 11 de novembro de 2019, o Ministério da Saúde estabelece situações em que poderá ocorrer a suspensão da transferência do incentivo financeiro federal de custeio mensal para os municípios e o Distrito Federal que tiverem aderido ao programa.

Marque a alternativa que corretamente descreve as circunstâncias em que a suspensão de incentivo poderá ocorrer:

- A () Ausência do envio de dados da Atenção Primária à Saúde por meio de prontuário eletrônico por 3 competências consecutivas; incorreção no cadastro da equipe da Saúde da Família ou equipe da Atenção Primária no SCNES, ou não alcance de parâmetros mínimos de envio dos dados da Atenção Primária à Saúde ao Ministério da Saúde estabelecidos no plano de monitoramento do Programa Informatiza APS, por 3 competências consecutivas.
- B () Ausência do envio de dados da Atenção Primária à Saúde por meio de prontuário eletrônico por 3 competências consecutivas; não alcance de parâmetros mínimos de envio dos dados da Atenção Primária à Saúde ao Ministério da Saúde, estabelecidos no plano de monitoramento do Programa Informatiza APS, por 3 competências consecutivas, ou não alcance de apenas um dos parâmetros mínimos de envio dos dados da Atenção Primária à Saúde ao Ministério da Saúde, estabelecidos no plano de monitoramento do Programa Informatiza APS, por 6 competências consecutivas.
- C () Ausência do envio de dados da Atenção Primária à Saúde por meio de prontuário eletrônico por 3 competências consecutivas; incorreção no cadastro da equipe da Saúde da Família ou equipe da Atenção Primária no SCNES; não alcance de parâmetros mínimos de envio dos dados da Atenção Primária à Saúde ao Ministério da Saúde, estabelecidos no plano de monitoramento do Programa Informatiza APS,

por 3 competências consecutivas, ou não alcance de apenas um dos parâmetros mínimos de envio dos dados da Atenção Primária à Saúde ao Ministério da Saúde, estabelecidos no plano de monitoramento do Programa Informatiza APS, por 6 competências consecutivas.

- D () Ausência do envio de dados da Atenção Primária à Saúde por meio de prontuário eletrônico por 3 competências consecutivas; incorreção no cadastro da equipe da Saúde da Família no SCNES; não alcance de apenas um dos parâmetros mínimos de envio dos dados da Atenção Primária à Saúde ao Ministério da Saúde, estabelecidos no plano de monitoramento do Programa Informatiza APS, por 3 competências consecutivas, ou não alcance de apenas um dos parâmetros mínimos de envio dos dados da Atenção Primária à Saúde ao Ministério da Saúde, estabelecidos no plano de monitoramento do Programa Informatiza APS, por 6 competências consecutivas.

QUESTÃO 47

Durante visita a alojamento conjunto, médico observa que uma mãe com lesões herpéticas nos lábios deseja amamentar seu filho, recém-nascido de parto normal a termo, pesando 3.100 g.

Assinale a alternativa que indica a correta orientação do médico:

- A () Não liberar a amamentação nessa situação.
- B () Liberar a amamentação após aplicação de imunoglobulina no recém-nascido.
- C () Não liberar a amamentação até as lesões ficarem em fase de crosta.
- D () Liberar a amamentação em livre demanda, com orientação para precaução de contato.

QUESTÃO 48

Paciente chega ao PS queixando dor no baixo ventre. Relata estar com menstruação atrasada em 2 semanas, mas não tem certeza de que esteja gestante. Associa sangramento vaginal irregular de pouca quantidade. Nega ato sexual recente e nega esforço físico acentuado.

Ao exame, apresenta: PA 80/40 mmHg, descorada ++/4, dor à palpação profunda no hipogástrico com descompressão positiva; toque: colo fechado, com dor acentuada em fundo de saco posterior, discreto sangramento vaginal. Foi solicitada ecografia endovaginal, que evidenciou líquido livre em fundo de saco posterior em moderada quantidade e beta hcg+.

Marque a alternativa que corretamente indica a hipótese diagnóstica:

- A () Gestação ectópica.
- B () Abortamento.
- C () Mola hidatiforme.
- D () Ameaça de abortamento.

QUESTÃO 49

Ao analisar os dados epidemiológicos da população da área de abrangência de uma Unidade Básica de Saúde da Família de um bairro de Goiânia, o médico da equipe verificou que as doenças cardiovasculares eram a principal causa de mortalidade em homens adultos.

Verificou também que, no seu horário de atendimento, a frequência na unidade era predominantemente feminina. Diante desse fato, ele propôs fazer uma escala com horários que contemplassem os homens desse bairro para cuidar dos aspectos relacionados à Saúde do Homem.

Essa iniciativa atende a que princípio do SUS? Assinale a alternativa correta:

- A () Integralidade.
- B () Igualdade.
- C () Universalidade.
- D () Equidade.

QUESTÃO 50

Em um acidente automobilístico, a vítima aguarda por socorro durante 9 horas. Suas pernas ficaram comprimidas contra a coluna de direção e imobilizadas durante toda a espera. Ao ser trazida ao setor de emergência de um hospital geral, a vítima apresenta a sensibilidade e movimentação comprometidas em ambas as pernas e pés, além de dor exacerbada à movimentação passiva, edema, cianose periférica em pododáctilos e ausência de pulsos palpáveis nas extremidades.

Realizado o diagnóstico, o procedimento terapêutico indicado com urgência no caso descrito é

- A () o uso de diuréticos.
- B () curativo compressivo.
- C () a escarotomia.
- D () a fasciotomia.

QUESTÃO 51

Paciente de 36 anos, masculino, branco é levado à emergência de um hospital com quadro de cefaleia grave (o paciente relata que foi a pior dor de cabeça de sua vida), que se instalou de modo rápido. A dor estava associada à rigidez de nuca, confusão mental e sonolência no início do quadro.

No momento do exame físico, apresenta pressão arterial elevada (163/108 mmHg), rigidez de nuca, fotofobia e ausência de confusão mental, sonolência ou sinais focais. É portador de doença renal policística autossômica dominante, mas não é hipertenso.

Marque a alternativa que indica corretamente o diagnóstico e a etiologia mais prováveis ao quadro clínico apresentado por esse paciente, considerados os dados da anamnese:

- A () Hemorragia subaracnóide; aneurisma.
- B () Hemorragia intracerebral primária; trombose venosa sinusal.
- C () Acidente vascular encefálico isquêmico; aterosclerose.
- D () Acidente vascular encefálico isquêmico; fibrilação atrial.

QUESTÃO 52

De acordo com a publicação sobre a nova Carteira de Serviços da Atenção Primária à Saúde, do Ministério da Saúde, de 2019, os serviços que podem estar disponíveis e ofertados pelas unidades de saúde na Atenção Primária são

- A () Vigilância em Saúde, Promoção à Saúde, Saúde do Homem e da Mulher, Atenção e Cuidados Centrados na Saúde da Criança e do Adolescente, Procedimentos na APS e Atenção e Cuidados Relacionados à Saúde Bucal.

- B () Vigilância em Saúde, Promoção à Saúde, Saúde do Homem e da Mulher, Atenção e Cuidados Centrados na Saúde da Criança e do Adolescente, Procedimentos na APS e Assistência Farmacêutica.
- C () Vigilância em Saúde, Promoção à Saúde, Atenção e Cuidados Centrados na Saúde do Adulto e do Idoso, Atenção e Cuidados Centrados na Saúde da Criança e do Adolescente, Procedimentos na APS e Atenção e Cuidados Relacionados à Saúde Bucal.
- D () Vigilância em Saúde, Promoção à Saúde, Atenção e Cuidados Centrados na Saúde do Adulto e do Idoso, Atenção e Cuidados Centrados na Saúde da Criança e do Adolescente, Procedimentos na APS e Assistência Farmacêutica.

QUESTÃO 53

Criança de 10 meses de idade apresenta quadro de coriza, tosse, febre, dor de garganta e dor ao engolir há 2 dias. Ao exame físico, apresenta-se em bom estado geral. Orofaringe com hiperemia e hipertrofia das amígdalas, com exsudato pontilhado branco bilateralmente.

Assinale a alternativa correta em relação à hipótese de diagnóstico e à conduta:

- A () Amigdalite de provável etiologia bacteriana; tratamento em domicílio com sintomáticos e orientação.
- B () Amigdalite de provável etiologia viral; tratamento em domicílio com sintomáticos e orientação.
- C () Amigdalite de provável etiologia viral; internação, tratamento de suporte, hidratação e orientação.
- D () Amigdalite de provável etiologia bacteriana; internação com antibiótico, sintomáticos e orientação.

QUESTÃO 54

Gestante de 28 semanas e 3 dias vem ao PS queixando dor no bv e mostra resultado de exames realizados. O TOTG 75 g, apresenta: de jejum, 97 mg/dl; de uma hora, 185 mg/dl e 2 horas, 152 mg/dl. Trouxe também o cartão de pré-natal com anotações de resultados anteriores.

Na primeira consulta, apresentava glicemia de jejum com 98 mg/dl, quando estava com 13 semanas e 4 dias de gestação.

Considerados esses resultados, assinale a alternativa que apresenta corretamente o diagnóstico:

- A () Diabetes gestacional diagnosticada com 28 semanas de gestação.
- B () Diabetes pré-gestacional diagnosticada com 28 semanas de gestação.
- C () Diabetes insulino-dependente.
- D () Diabetes gestacional diagnosticada com 13 semanas de gestação.

QUESTÃO 55

A atual política de saúde mental brasileira é resultado da mobilização de usuários, familiares e trabalhadores da Saúde, iniciada na década de 1980, com o objetivo de mudar a realidade dos manicômios, onde viviam mais de 100 mil pessoas diagnosticadas com transtornos mentais diversos.

Ainda na década de 1980, experiências municipais iniciaram a desinstitucionalização de internos em manicômios, criando serviços para realizar a sua reinserção em seus territórios existenciais.

A Política Nacional de Saúde Mental compreende estratégias e diretrizes adotadas pelo País para organizar a assistência às pessoas com necessidades de tratamento e cuidados específicos em saúde mental.

As unidades de caráter aberto e comunitário, constituídas por equipe multiprofissional, que prestam serviços de saúde e atuam sobre a ótica interdisciplinar, realizando prioritariamente atendimento a pessoas com sofrimento ou transtorno mental, inclusive aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, são

- A () os Serviços Residenciais Terapêuticos.
- B () os Ambulatórios Multiprofissionais de Saúde Mental.
- C () os Centros de Atenção Psicossocial.
- D () as Comunidades Terapêuticas.

QUESTÃO 56

Ao assistir um paciente acidentado por trauma, qual a primeira precaução a ser tomada pelo médico socorrista? Assinale a alternativa correta:

- A () Manter a via aérea pérvia.
- B () Controlar a cervical.
- C () Expor as feridas.
- D () Zelar pela segurança da cena de trauma.

QUESTÃO 57

Paciente de 52 anos, branco, masculino, tem diagnóstico de gastrite crônica com leve metaplasia intestinal (endoscopia e biópsia gástrica), está em tratamento há 3 anos, com uso de ranitidina ou omeprazol (“depende do que o posto de saúde fornece”).

Volta ao ambulatório com relato de piora importante da dor epigástrica, que não cede nem com alimentos ou medicação. Relata ainda perda de peso nos últimos 3 meses (pesava 80 kg e agora está com 68 kg), saciedade precoce, vômitos, fadiga, astenia e mal-estar. Acredita estar anêmico e diz que ainda não parou de fumar.

Consideradas essas informações, assinale a alternativa que apresenta a possibilidade diagnóstica para esse paciente:

- A () Úlcera gástrica.
- B () Doença do refluxo gastroesofágico.
- C () Câncer de estômago.
- D () Câncer de esôfago.

QUESTÃO 58

Considere a Portaria GM/MS nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e estabelece a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do SUS.

Marque a alternativa que corretamente apresenta as atribuições comuns a todos os membros da equipe que atuam na Atenção Básica:

- A () Realizar o cuidado parcial à saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da Unidade Básica de Saúde e,

quando necessário, no domicílio e em demais espaços comunitários.

- B () Realizar ações de Atenção à Saúde, conforme necessidade de saúde da população, bem como aquelas previstas como prioridades em protocolos e diretrizes clínicas e terapêuticas.
- C () Responsabilizar-se pela população geral, mantendo a coordenação do cuidado, mesmo quando houver necessidade de observação de outros pontos de atenção ao Sistema de Saúde.
- D () Instituir ações para a Segurança do Paciente e propor medidas para reduzir os riscos e diminuir os eventos adversos.

QUESTÃO 59

Uma menina de 11 meses de idade é trazida para consulta de rotina. A mãe queixa que a criança está muito inquieta e inapetente. Nasceu de parto normal a termo, pesando 2.950 g. A mãe refere aleitamento materno até os 6 meses de idade e desmame com 8 meses. Atualmente, toma leite integral de vaca 4 vezes ao dia e come a comida da família. Mas, come pouco. Calendário vacinal atualizado.

Ao exame físico, a criança está em bom estado geral, apresenta-se inquieta e irritada, tem mucosas hipocoradas ++/++++, sem adenomegalia e sem hepatoesplenomegalia. O desenvolvimento neuropsicomotor é adequado para sua idade. Em exame de sangue solicitado, o resultado da hemoglobina é de 8,0 g/dl.

Assinale a alternativa correta sobre o diagnóstico e a conduta a ser seguida:

- A () Anemia falciforme; tratamento com ferro oral.
- B () Anemia ferropriva; tratamento com concentrado de hemácias.
- C () Anemia ferropriva; tratamento com ferro oral.
- D () Anemia megaloblástica; tratamento com ácido fólico.

QUESTÃO 60

Sobre a relação da fisiologia da produção e ejeção do leite materno, assinale a alternativa correta:

- A () A lactogênese não ocorre durante a gestação devido aos efeitos inibitórios produzidos por estrógeno, progesterona e ocitocina.
- B () Com o parto e a dequitação, há um decréscimo abrupto nos níveis circulantes de estrógenos, progesterona e hpl produzidos pela placenta, possibilitando a ação da prolactina.
- C () A manutenção da produção do leite e sua ejeção são mediados pela prolactina na hipófise anterior.
- D () A amenorreia pós-parto para pacientes em amamentação é mediada pelo estímulo neuroendócrino negativo da prolactina e da ocitocina sobre o GNRH.

Rascunho

Rascunho